

Denna information delas ut av din vaccinatör

Till dig som vaccinerat ditt barn eller själv vaccinerats med Varivax® *(levande försvagat vattkoppsvaccin)*

Vaccination mot vattkoppor orsakat av vattkoppsviruset Varicella Zoster



Information om Varivax till patienter

Läs noga igenom bipacksedeln innan du eller ditt barn vaccineras.
Den innehåller information som är viktig för dig eller ditt barn.
Bipacksedeln finns tillgänglig via [FASS.se](https://fass.se)



I denna folder finner du information och vanliga frågor om vattkoppsvaccinet **Varivax**

Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket via deras hemsida; lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om vaccinets säkerhet.



Vad gör Varivax?

Varivax är ett levande försvagat vaccin innehållande varicellavirus och används för att skydda vuxna och barn mot vattkoppor. Vaccin används för att skydda dig eller ditt barn mot infektionssjukdomar.

Varivax kan ges till personer som är 12 månader gamla eller äldre.

Varivax kan även ges till spädbarn från 9 månaders ålder under särskilda omständigheter, som för att följa nationella vaccinationsprogram eller i utbrottssituationer.

Det kan även ges till personer som inte har haft vattkoppor, men som har exponerats för någon som har vattkoppor.

Vaccinering inom 3 dagar efter exponeringen kan hjälpa till att förhindra vattkoppor eller minska sjukdomens svårighetsgrad och ge färre hudutslag samt kortare sjukdomsperiod. Det finns dessutom begränsad information om att vaccinering upp till 5 dagar efter exponeringen kan minska allvarlighetsgraden av sjukdomen.

Hur många sprutor behöver man ta?

Varivax rekommenderas med två sprutor både för barn och vuxna.



Hur lång tid ska gå mellan doserna?

För att säkerställa optimalt skydd mot vattkoppor ges Varivax i form av en injektion enligt följande:

Spädbarn från 9 månaders till 12 månaders ålder:

Under särskilda omständigheter (i överensstämmelse med nationella vaccinationsprogram eller vid utbrott av vattkoppor) kan Varivax administreras mellan 9 och 12 månaders ålder. Två doser ges och det bör gå minst tre månader mellan doserna.

Barn från 12 månaders till 12 års ålder:

Två doser Varivax bör ges med minst en månads mellanrum.

Tonåringar från 13 år samt vuxna:

Den andra dosen ska ges 4 till 8 veckor efter den första dosen.

Antalet doser och tidpunkten för doserna ska bestämmas av din läkare utifrån officiella rekommendationer.

Vilka biverkningar kan man få?

Liksom alla vaccin och läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem.

Vanliga och mycket vanliga biverkningar är feber, hudrodnad/utslag/klåda vid injektionsstället, smärta/ömhet/känslighet och svullnad, vattkoppsliknande utslag, infektion i övre luftvägarna och irritabilitet.

Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Vad kan man ta för febernedsättande läkemedel?

Vaccinerade personer bör undvika produkter som innehåller acetylsalicylsyra under 6 veckor efter vaccinering med Varivax. Man kan ta produkter som innehåller paracetamol.

Hur väl skyddar Varivax?

Nästan alla småbarn utvecklar antikroppar mot vattkoppsvirus redan efter en dos vaccin. Vid vaccinering i vuxenåldern eller efter puberteten utvecklas enligt Folkhälsomyndigheten antikroppar hos cirka 80 % av de vaccinerade efter en dos, och hos så gott som 100 % efter två doser. Om en person insjuknar trots vaccinering får personen en betydligt mildare form av vattkoppor.

Som med andra vaccin skyddar Varivax inte fullständigt från naturligt förvärvade vattkoppor.

När borde man avstå från vaccination med Varivax?

Använd inte Varivax om något av följande gäller dig eller ditt barn:

- Allergi mot något vaccin mot vattkoppor, mot något annat innehållsämne i detta vaccin, eller neomycin (se bipacksedeln).
- Nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom (såsom cancer eller hiv) eller läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret (inklusive höga doser av kortikosteroider).
- Har en familjemedlem som fötts med nedsatt immunförsvar, eller om det nu eller tidigare funnits familjemedlemmar med nedsatt immunförsvar.
- Aktiv obehandlad tuberkulos.
- Temperatur som överstiger 38,5 °C. Låg feber ensamt är dock inget skäl för att inte vaccineras.
- Graviditet. Dessutom bör graviditet undvikas under 1 månad efter vaccination.

Var kan jag hitta information om vattkoppor?

Du kan läsa om vattkoppor på t.ex. Folkhälsomyndighetens hemsida folkhalsomyndigheten.se samt på [Vårdguiden 1177.se](http://Vardguiden.1177.se).



För mer information om användning, varningar
och begränsningar läs bipacksedeln på fass.se.

Kontakta din vaccinatör eller annan
sjukvårdspersonal om du har frågor.

Läs om vattkoppor på ingavattkoppor.nu



Plats för vaccinatörs stämpel eller egna anteckningar



msd.se, 08-578 135 00

Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.
All rights reserved.

SE-VVX-00116 11/24