



HPV (Humant Papillomvirus)
drabbar både män och kvinnor

HPV (Humant Papillomvirus)


HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige och i världen. Det drabbar mer än 80 % av alla sexuellt aktiva män och kvinnor någon gång i livet.

Kondom skyddar inte fullt ut eftersom HPV smittar både mellan slemhinnor och vid hud mot slemhinna.

Det finns många olika typer av HPV. De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva medan andra blir kvar i kroppen och kan leda till könsvärtor (kondylom) eller cellförändringar, som in sin tur kan leda till cancer, exempelvis analcancer.

Män är utsatta för HPV genom livet

Virusnivåerna hos män går inte ner med åldern, vilket gör att man riskerar att smitta andra med åren.



HPV kan finnas i kroppen i många år utan att man märker av det. Det går därför inte att veta när man har blivit smittad.

Hos kvinnor är förekomsten som högst mellan 18-29 år, för att sedan minska medan förekomsten hos män fortsatt ligger högt under hela livet.

HPV-sjukdomsbördan hos män är sannolikt underskattad. I dagsläget finns det ingen etablerad screening eller test för att få reda på vilka HPV-virus män har, såsom det gör vid förstadiet till livmoderhalscancer. Det går dock att förebygga HPV-infektioner genom vaccination.


Ovaccinerade män får oftare återkommande infektioner



Vissa grupper löper ökad risk för sjukdomar som följd av HPV-infektioner

Män som har sex med män (MSM), Personer som lever med hiv, Transpersoner

1. Risken för att drabbas av analcancer jämfört med övriga befolkningen är i globala siffror:
 - ca 20 gånger högre hos MSM
 - ca 100 gånger högre hos MSM som lever med hiv
2. Transpersoner och personer som lever med hiv har högre förekomst av HPV jämfört med övriga befolkningen, enligt en studie från Karolinska Institutet (KI).
3. Infektion med HPV är vanlig hos män och kvinnor som lever med hiv och kroppen har svårare att läka ut infektionen i dessa fall.



Läs mer på
HPV vaccin



hpvvaccin.se

