



HPV (Humant Papillomvirus)  
drabbar även unga män



# HPV (Humant Papillomvirus)

HPV är den vanligaste sexuellt överförd infektion i Sverige och i världen. Det drabbar mer än 80 % av alla sexuellt aktiva män och kvinnor någon gång i livet.


Kondom skyddar inte fullt ut eftersom HPV smittar både mellan slemhinnor och vid hud mot slemhinna.

Det finns många olika typer av HPV. De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva medan andra blir kvar i kroppen och kan leda till könsvärtor (kondylom) eller cellförändringar, som in sin tur kan leda till cancer, exempelvis analcancer.

Cirka 20 000 svenskar (män/kvinnor) drabbas av kondylom och ca 300 män diagnostiseras med HPV-relaterad cancer varje år.

## Män är utsatta för HPV genom livet

**Virusnivåerna hos män går inte ner med åldern, vilket gör att man riskerar att smitta andra med åren.**



HPV kan finnas i kroppen i många år utan att man märker av det. Det går därför inte att veta när man har blivit smittad.

Hos kvinnor är förekomsten som högst mellan 18-29 år, för att sedan minska medan förekomsten hos män fortsatt ligger högt under hela livet.

HPV-sjukdomsburden hos män är sannolikt underskattad. I dagsläget finns det ingen etablerad screening eller test för att få reda på vilka HPV-virus män har, såsom det gör vid förstadier till livmoderhalscancer. Det går dock att förebygga HPV-infektioner genom vaccination.

# Ovaccinerade män får oftare återkommande infektioner



**20 000 (ca) svenskar (män/kvinnor) drabbas av kondylom varje år**

Kondylom hos män:

- ← **~44 %** minst ett återfall av kondylom
- ← **~22 %** minst två återfall av kondylom

Könsvärtor är mycket smittsamma och kan vara både obehagliga och generande. Du kan ofta se eller känna vårtorna som kan se ut på olika sätt. Det vanligaste är flikiga eller rundade och lätt upphöjda vårtor.

Vårtorna kan ha samma färg som din hud men de kan även vara rosa, vitaktiga, röda eller bruna. De kan finnas en och en, men oftast finns flera samtidigt. I en del fall kan vårtorna sitta mycket tätt så att de ser ut som enstaka stora utväxter.

**Du kan också få ett eller flera av följande symtom:**

- klåda eller sveda
- små blödningar från vårtorna
- besvär vid samlag

**ca 90 %**  
av alla kondylomfall  
kan förebyggas med  
vaccination.

**Kondylom kan sitta på olika platser i underlivet**

- På penis
- På förhuden
- Vid urinröret
- Runt anus
- I ljumskarna

Läs mer på  
HPV vaccin



[hpvvaccin.se](https://hpvvaccin.se)

