

Till dig som vaccinerat ditt barn med  
**RotaTeq®** (*Levande vaccin mot rotavirus*)

## VACCINATION MOT GASTROENTERIT ORSAKAT AV ROTAVIRUSINFEKTION (diarré och kräkningar)



Denna information delas ut av berörd sjukvårdspersonal  
i samband med vaccination med RotaTeq.

**Läs noga igenom bipacksedeln på [fass.se](http://fass.se).**



## **I denna folder finner du information och vanliga frågor om rotavirusvaccinet RotaTeq.**

Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska på din BVC. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket via deras hemsida; [lakemedelsverket.se](http://lakemedelsverket.se).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om vaccinets säkerhet.

### **Kort om gastroenterit orsakad av rotavirus (diarré och kräkningar)**

Rotavirus är den vanligaste orsaken till svår diarrésjukdom hos spädbarn och småbarn över hela världen, med symtom som kräkningar och vattnig diarré, ofta med feber och buksmärter.

Utan vaccination drabbas i stort sett alla barn av en eller flera rotavirusinfektioner före fem års ålder.

Rotavirus smittar lätt och kan spridas via händer, mun, nappar och leksaker. Att tvätta händer och andra ytor kan minska risken att bli sjuk och att smittan sprids, men det går inte att stoppa smittspridningen helt.



## Vad gör RotaTeq?

RotaTeq är en oral lösning i förfylld klämtub, det vill säga ett vaccin som ges via munnen. Vaccinet hjälper till att skydda spädbarn mot gastroenterit (diarré och kräkningar) orsakade av rotavirusinfektion. Vaccinet innehåller 5 typer av levande rotavirusstammar. När ett spädbarn får vaccinet, bildar immunsystemet (kroppens eget försvar) antikroppar mot de vanligast förekommande typerna av rotavirus. Antikropparna hjälper till att skydda mot gastroenterit orsakat av dessa typer av rotavirus.

RotaTeq kan ges till spädbarn från 6 till 32 veckors ålder.

## Hur många doser behöver man ta?

Ditt barn får 3 doser RotaTeq med minst fyra veckors mellanrum. Det är viktigt att ditt barn får alla 3 doser av vaccinet för skydd mot rotavirus. Det rekommenderas att alla tre doserna har givits vid 20-22 veckors ålder.

Rotavirusvaccin ges enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet vid 6 veckor, 3 månader och 5 månaders ålder.



## Vilka biverkningar kan man få?

Liksom alla vaccin och läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem.

Sök omedelbart vård om ditt barn får något av följande symtom:

- Allergiska reaktioner som kan vara allvarliga, till exempel en allergisk svullnad som kan påverka ansiktet, läpparna, tungan eller svalget.
- Kramp i luftrören som kan uppträda som väsande andning, hosta eller svårigheter att andas. Det är sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 spädbarn).
- Svår magsmärta, ihållande kräkningar, blod i avföringen, svullen mage och/eller hög feber. Dessa kan vara symtom på en mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 spädbarn) men allvarlig biverkan som kallas tarminvagination.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter) eller vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter) är feber, diarré, kräkningar och övre luftvägsinfektioner.

Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska på din BVC. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

## Vad behöver du veta innan ditt barn får RotaTeq?

Tala med läkare eller sjuksköterska innan vaccination om ditt barn:

- har genomgått en blodtransfusion eller mottagit immunoglobulin under de senaste 6 veckorna
- har en tät kontakt med exempelvis en familjemedlem som har ett försvagat immunsystem, t.ex. en person som har cancer eller som tar mediciner som kan försvaga immunsystemet
- har någon rubbning i magtarmkanalen
- inte har ökat i vikt och längd så som kan förväntas
- nyligen har tagit eller kan tänkas få andra läkemedel (eller andra vacciner)
- inte tål vissa sockerarter
- eller om modern under graviditeten har tagit något läkemedel som försvagar immunsystemet.

Var som vanligt noga med att tvätta händerna noggrant när du bytt smutsiga blöjor. Liksom alla vacciner kan det hända att RotaTeq inte fullständigt skyddar alla barn som vaccineras, även när alla tre doser har tagits. Om ditt barn redan har infekterats med rotavirus men ännu inte är sjukt vid vaccinationstillfället, så kan det hända att RotaTeq inte kan förhindra sjukdomen.

RotaTeq skyddar inte mot diarré och kräkning på grund av andra orsaker än rotavirus.



## När bör man avstå från vaccination med RotaTeq?

Använd inte RotaTeq om något av följande gäller ditt barn:

- Vid allergi mot något av vaccinets innehållsämnen eller en allergisk reaktion efter att ha fått en dos av RotaTeq eller något annat rotavirusvaccin.
- Har haft tarminvagination (en tarmförträngning där en sektion av tarmen omsluter en annan sektion).
- Föddes med missbildning i magtarmkanalen som kan leda till mottaglighet för tarminvagination.
- Har sjukdom som reducerar motståndet mot infektioner.
- Vid allvarlig infektion, hög feber, diarré eller kräkningar. Det kan bli nödvändigt att senarelägga vaccinationen tills efter tillfrisknandet. En mildare infektion, som en förkylning, bör inte vara något problem, prata dock med din BVC-mottagning först.

## Var kan jag hitta mer information?

Du kan läsa mer om Rotavirus och vaccination på t.ex. Folkhälsomyndighetens hemsida [folkhalsomyndigheten.se](http://folkhalsomyndigheten.se) samt på [Vårdguiden 1177.se](http://Vardguiden.se).

**För mer information om användning,  
varningar och begränsningar läs  
bipacksedeln på [fass.se](http://fass.se).**

**Kontakta din barnvårdscentral eller  
annan sjukvårdspersonal om  
du har frågor.**

**Plats för vaccinatörs stämpel**



MSD.se SE-ROT-00009 08/23

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.  
Merck Sharp & Dohme (MSD) Sweden AB. PO Box 45192, 104 30 Stockholm, tel 08-578 135 00