

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Alla barn i Sverige erbjuds gratis vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinerna mot alla tre sjukdomarna ges i samma spruta.

Vaccinering sker vid två tillfällen: dels på barnvårdscentralen, när barnet är 1 1/2 år och dels i skolan:

- barn födda t o m 2001 i årskurs 6
- barn födda fr o m 2002 i åldern 6-8 år.

Vaccinationsdatum _____

har/kommer ert barn _____

vaccineras med en dos _____

Efter injektionen kan barnet få feber eller en reaktion vid injektionsstället i form av rodnad, smärta och svullnad (kan förekomma hos fler än 1 av 10 vaccinerade).

Utslag (inklusive mässlingliknande utslag) samt blåmärken på injektionsstället kan förekomma hos 1 till 10 av 100 vaccinerade.

För mer sällsynta biverkningar, se www.fass.se.

De virus som finns i vaccinet är försvagade. De kan därför inte sprida sig till andra friska barn eller vuxna i omgivningen, inte ens då de vaccinerade barnen har fått feber eller utslag. Barn som får feber bör dock stanna hemma till temperaturen åter blivit normal



MSD

Tfn 08-578 135 00
www.msd.se

Varför vaccinerar man mot dessa sjukdomar?

Mässling är en mycket smittsam sjukdom med hög feber, hosta och utbredda hudutslag. Hos c:a en av 1000 mässlingpatienter tillstöter hjärninflammation, som i en del fall ger bestående skador.

Påssjuka är en av de vanligaste orsakerna till hjärnhinneinflammation hos barn och kan ge bestående dövhet. Pojkar som insjuknar i påssjuka efter puberteten kan få testikelinflammation, som kan vara mycket smärtsam och dessutom i sällsynta fall orsaka sterilitet.

Röda hund kan ge allvarliga fosterskador om gravida kvinnor blir smittade. Genom att vaccinera alla barn - även pojkar - kan vi förhindra att gravida smittas med röda hund.

Andra vanliga frågor

Barn med pågående feber över $>38^{\circ}\text{C}$ bör inte vaccineras. En vanlig förkylning utan feber är dock inget hinder för vaccination. Immunoglobuliner bör inte ges inom en månad efter vaccination med MPR. Om immunoglobuliner redan givits ska man vänta 3 månader innan vaccination med MPR vaccin ges.

Det kombinerade vaccinet bör även ges till barn som har haft, eller som man tror har haft, någon eller flera av sjukdomarna. Detta för att röda-hund-diagnosen ofta är felaktig, vilket även kan vara fallet med diagnos av mässling och påssjuka. Barn som tidigare vaccinerats mot någon av dessa sjukdomar bör också få det kombinerade vaccinet.

För mer information kontakta din läkare.

Referenser:

- Socialstyrelsen 2006:22
"Socialstyrelsens föreskrifter om vaccination av barn"
Utgivare: Chefsjurist Nils Blom
- Smittskyddsinstitutet
"Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund (MPR)
- SPC daterad 01/2017



Tfn 08-578 135 00
www.msd.se